

Bronchiolite	Impétigo
<p><b>Symptômes</b> Toux creuse, écoulement nasal, fièvre légère, respiration sifflante, augmentation de la fréquence respiratoire</p> <p><b>Incubation</b> De 2 à 8 jours</p> <p><b>Contagiosité</b> La période est de 3 à 8 jours après le début de la maladie, mais peut aller jusqu'à 3 semaines</p> <p><b>Exclusion</b> Ne pas exclure l'enfant si son état de santé lui permet de participer aux activités du groupe.</p>	<p><b>Symptômes</b> Lésions cutanées indolores, purulentes et croûteuses situées surtout au visage (nez, bouche, menton et arrière des oreilles)</p> <p><b>Incubation</b> De 7 à 10 jours</p> <p><b>Contagiosité</b> Rarement plus de 24 à 48 heures après le début de la prise des antibiotiques par la bouche</p> <p><b>Exclusion</b> Exclure l'enfant durant au moins 24 heures après le début du traitement antibiotique. Sans traitement, exclure l'enfant jusqu'à la disparition des lésions.</p>
Conjonctivite	Grippe
<p><b>Symptômes</b> Rougeur, gonflement des paupières, sensibilité à la lumière, écoulement clair ou purulent, paupières collées le matin, sensation de corps étranger, larmolement.</p> <p><b>Incubation</b> Généralement que quelques jours.</p> <p><b>Contagiosité</b> Infection virale : jusqu'à 14 jours. Infection bactérienne : surtout au moment de l'écoulement.</p> <p><b>Exclusion</b> Pas d'exclusion, sauf en cas d'épidémie.</p>	<p><b>Symptômes</b> Fièvre élevée, toux, mal de gorge, douleurs musculaires, fatigue, épuisement. Vomissements, douleur abdominale et diarrhée, surtout fréquents chez les enfants.</p> <p><b>Incubation</b> De 1 à 4 jours</p> <p><b>Contagiosité</b> 24 heures avant le début des symptômes et jusqu'à 7 jours après.</p> <p><b>Exclusion</b> Ne pas exclure l'enfant si son état de santé lui permet de participer aux activités du groupe.</p>
Gastroentérite	Otite Moyenne
<p><b>Symptômes</b> Nausées, vomissements, douleurs abdominales, diarrhée, fièvre.</p> <p><b>Incubation</b> De quelques heures à quelques jours.</p> <p><b>Contagiosité</b> Correspond habituellement à la phase aiguë de la maladie.</p> <p><b>Exclusion</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fait de la fièvre;</li> <li>• a eu 2 vomissements ou plus au cours des 24 dernières heures;</li> <li>• a du sang et du mucus dans ses selles;</li> <li>• si les selles ne peuvent pas être contenues dans la couche ou que l'enfant est incontinent</li> </ul>	<p><b>Symptômes</b> Fièvre, douleur à l'oreille, pleurs, irritabilité chez le nourrisson, diminution de l'appétit, réveils nocturnes et écoulement de l'oreille</p> <p><b>Incubation</b> Variable selon l'agent infectieux et les facteurs prédisposant de l'enfant.</p> <p><b>Contagiosité</b> L'otite n'est pas contagieuse.</p> <p><b>Exclusion</b> Ne pas exclure l'enfant si son état de santé lui permet de participer aux activités du groupe.</p>
Cinquième Maladie	Infection au streptocoque et scarlatine
<p><b>Symptômes</b> Symptômes ressemblant au rhume, mal de tête, malaise général, douleurs musculaires ou articulaires</p> <p>Éruption cutanée débutant au visage (joues très rouges) et évoluant vers le tronc et les membres</p> <p><b>Incubation</b> Généralement de 4 à 14 jours, mais peut se prolonger jusqu'à 21 jours.</p> <p><b>Contagiosité</b> Jusqu'à 7 jours avant l'apparition de l'éruption.</p> <p><b>Exclusion</b> Ne pas exclure l'enfant si son état de santé lui permet de participer aux activités du groupe.</p>	<p><b>Symptômes</b> Fièvre, mal de gorge, nausées, vomissements, perte d'appétit, mal de tête, enflure des ganglions du cou et rougeur de la gorge</p> <p><b>Incubation</b> De 2 à 5 jours.</p> <p><b>Contagiosité</b> Jusqu'à 24 heures après le début du traitement antibiotique. De 2 à 3 semaines si l'infection n'est pas traitée.</p> <p><b>Exclusion</b> Exclure l'enfant jusqu'à 24 heures après le début du traitement et jusqu'à ce que son état lui permette de participer aux activités.</p>
Pieds-Mains-Bouche	Varicelle
<p><b>Symptômes</b> Fièvre et apparition de rougeurs sous forme de vésicules ou d'ulcères à la bouche, de taches rouges ou de vésicules aux mains, aux pieds, refus de s'alimenter, irritabilité, diarrhée.</p> <p><b>Incubation</b> De 3 à 6 jours.</p> <p><b>Contagiosité</b> La contagion est maximale lorsque les symptômes sont présents. Le virus peut persister dans les selles plusieurs semaines et même des mois</p> <p><b>Exclusion</b> Ne pas exclure l'enfant si son état de santé lui permet de participer aux activités du groupe.</p>	<p><b>Symptômes</b> Fièvre légère, éruption généralisée accompagnée de démangeaisons. L'éruption évolue dans le temps : rougeurs, vésicules, croûtes.</p> <p><b>Incubation</b> Généralement de 14 à 16 jours, mais peut varier entre 10 et 21 jours.</p> <p><b>Contagiosité</b> De 1 à 2 jours avant le début de l'éruption et jusqu'à ce que toutes les lésions soient croûtées. La varicelle est très contagieuse</p> <p><b>Exclusion</b> Ne pas exclure l'enfant si son état de santé lui permet de participer aux activités du groupe.</p>